¹UR 342 Technologie Analyse Laitire, Poligny, France

²UR 545 fromagre, Aurillac, France

³Normandie Univ, UNICAEN, ABTE, France

Introduction

L'homme utilise depuis des millnaires la diversit du microbiote* des laits, sans en connaitre toute la richesse.

Une trs grande varit de produits laitiers ferments en a rsult grce des savoir-faire fromagers qui prservent et utilisent la diversit des activits acidifiante, texturante et aromatisante des microbiotes au cours des fermentations, tout en matrisant le risque pathogne.

De trs nombreuses varits de fromage sont actuellement fabriques de la sorte, qui seront appeles traditionnelles.

Une revue (Montel et al, 2014) s'appuyant sur 359 travaux scientifiques souligne la richesse gustative et la qualit sanitaire assures par les microbiotes des fromages traditionnels. Certains points abords dans cette revue sont illustrs sur ce poster.

* Ensemble des microorganismes

Quel devenir des microbiotes lait cru cur et en surface des fromages?

Comparaison Inventaire du nombre d'espces dominantes par grandes familles dans le lait et cur et en surface de fromages

Conclusions

Des atouts indniables des microbiotes traditionnels pour les caractristiques des fromages

- Utopique d'esprer obtenir la vaste gamme des caractristiques des fromages traditionnels au lait cru par ajout de souches slectionnes des laits dbarasss de la plus grande partie de leur microflore natives car :
- ncessit de reconstituer la gamme de diversit des microbiotes des fromages traditionnels au lait cru et de leurs environnements.
- perte de potentiels mtaboliques lis la production de composs de saveur, en utilisant des souches natives du lait cru ayant connu de nombreux repiquages dans des environnements diffrents de leur environnement d'origine (cas des souches commerciales)

Itinraires technologiques des fromages traditionnels

Les fromages AOP au lait cru sont actuellement les fromages traditionnels par excellence. Ils ont toutes les caractristiques cites pour les produits alimentaires traditionnels : production dans des zones gographiques circonscrites, utilisation de savoir-faire et de techniques spcifiques transmis de gnration en gnration, et utilisation de laits ayant subi peu ou aucun traitement aprs la traite. Les fromages AOP au lait cru sont trs souvent issus de zones montagneuses, et sont essentiellement fabriqus dans de petites units de transformation. La dnomination « fromage traditionnel » s'tend aussi aux fromages fabriqus avec du lait dont le microbiote natif est trs fortement rduit par divers traitements du lait, lorsqu'ils sont fabriqus la ferme ou dans de petites units et inoculs avec des levains acidifiants varis, et lorsque le microbiote d'affinage peut s'exprimer (30 % des fromages AOP en France).

Diversit microbienne entre laits crus

⇒ Diversit des caractristiques sensorielles entre fromages affins d'une mme varit

Diversit de saveur et de texture lie la composition* du microbiote du lait en cuve
*quantit chaque espce, composition en espce, composition en souche/chaque espce

Mise en vidence pour des fromages exprimentaux au lait cru ne variant entre eux que par les diversits microbiennes 1 ou 2, qui miment une partie des diversits microbiennes existant entre laits de fabrication traditionnels

*Reprsentation des fromages sur le cercle de corrlation des variables sensorielles (ACP)

Rfrence cite

Montel Marie-Christine^a, Buchin Solange^b, Mallet Adrien^c, Delbes-Paus Cline^a, Vuitton Dominique A.^d, Desmases Nathalie^c, Berthier Franoise^b. "Traditional cheeses: rich and diverse microbiota with associated benefits", *Revue bibliographique, International Journal of Food Microbiology*, 2014, 177, 136-154.